





◆ 關於淋病的原因和防止法

淋病之起由於淋菌之侵入尿道。淋菌之侵入尿道。有兩種原因。一由直接傳染。二由間接傳染。直接傳染者。如男女交接。淋菌由一方之尿道。侵入他方之尿道。間接傳染者。如用過淋菌患者之毛巾。或坐過淋菌患者之坐墊。或淋菌患者之分泌物。污染衣物。而後接觸。均可傳染。淋菌之侵入尿道。後即繁殖。引起炎症。尿道發炎。則有膿液流出。此即淋病之徵候。淋病之治療。應注意休息。多飲水。並服用抗生素。如青霉素。或鏈霉素。等。以殺滅淋菌。尿道發炎。則可用藥水沖洗。如硼酸水。或呋喃西林水。等。以消炎。淋病之預防。應注意個人衛生。不潔交接。不共用毛巾。坐墊。等。淋菌患者之分泌物。應及時清理。並消毒。淋病之傳染。多由不潔交接引起。故預防淋病。應注意個人衛生。不潔交接。不共用毛巾。坐墊。等。淋菌患者之分泌物。應及時清理。並消毒。淋病之傳染。多由不潔交接引起。故預防淋病。應注意個人衛生。不潔交接。不共用毛巾。坐墊。等。淋菌患者之分泌物。應及時清理。並消毒。